

COULEUVRE VIPERINE

Surnom : -

Nom scientifique : *Natrix maura.*

Habitat : Eaux courantes ou stagnantes, bien ensoleillées. Principalement en bord de rivières, ruisseaux, mais aussi dans les étangs, mares, marais… Espèce s'éloignant rarement de l'eau.

Longueur : 54 à 70 cm, mâle plus petit que la femelle.

Poids : -

Menus et plats préférés : Poissons, têtards, tritons (adultes et larves), plus rarement des grenouilles.

Ses habitudes : Diurne et essentiellement aquatique, nage, plonge et se chauffe au soleil au bord de l'eau. Elle se reproduit sur des buissons bas ou des rochers. Elle hiverne d'octobre-novembre à mars-avril.

Où la rencontrer : Sud Ouest de la France, jusqu'à 1 500 m d'altitude. Espèce en diminution en France par suite de la pollution des eaux et de l'empoisonnement de ses proies par les pesticides. Souvent tuée par l'Homme qui la prend pour une vipère.

Comment la reconnaître : La couleur peut varier : brune ou grisâtre, parfois nuancée de jaune, de rouge ou de vert olive, marquée de taches brunes ou noires. Certains individus peuvent ressembler à des vipères. Les écailles de la lèvre supérieure sont claires avec une bordure foncée très visible.

Différence avec la vipère : absence de motifs en zigzag, tête de la vipère en forme de triangle, pupille de la couleuvre ronde.

La couleuvre ne présente aucun danger pour l'homme. Lorsqu'elle se sent menacée, elle peut se mettre sur le dos et faire la morte, la gueule ouverte. Elle mord rarement et n'est pas venimeuse. Lorsqu'on la capture, elle émet parfois un liquide jaunâtre visqueux, d'une glande anale, à l'odeur rance pénétrante, difficile à laver. La couleuvre a des muscles assez puissants pour s'enrouler autour du bras lorsqu'on la saisie par la queue.

La peau des serpents n'est pas visqueuse comme on le croit parfois. Elle est recouverte d'écailles sèches, petites plaques de corne, disposées comme les tuiles d'un toit, pour protéger le corps.

Les œufs sont pondus dans une coquille dure, selon les espèces de reptiles. Le développement du serpent (larvaire) se déroule entièrement dans l'œuf.